

Gamme Élevage

Aliment granulé complémentaire de fourrage spécialement formulé pour les poulinières gestantes et allaitantes, les poulains en croissance et les étalons en période de monte



REPRO GR

Les phases de gestation et de lactation sont des périodes clés nécessitant un parfait équilibre nutritionnel pour assurer une croissance harmonieuse du poulain. Repro GR se distingue par la diversité de ses apports protéiques et énergétiques qui sont nécessaires aux exigences élevées des poulinières en lactation.



Vrac Zone 2 Minimum de commande 2T • Réf. 77003602

Vrac Zone 3 Minimum de commande 2T • Réf. 77003603



1L = 670g

Composition :

Orge, Remoulage de blé, luzerne, tourteau d'extraction de colza, coque de pois, pulpe de betterave, soja toasté, maïs, mélasse d'isomaltulose, tourteau de pression de graine de lin, carbonate de calcium, graine de lin, bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, maërl, produits dérivés de levures, mélasse de betterave.

Valeurs biochimiques/kg :

Matière sèche :	89 %
Protéines brutes :	15 %
Matières grasses brutes :	4.50 %
Cellulose brute :	12.50 %
Cendre brute :	8 %
Calcium :	1.10 %
Phosphore :	0.56 %
Amidon :	23 %

Valeurs de rationnement :

UFC :	0.90
MADC :	120g

Oligo-éléments/kg brut :

Zinc (sulfate) :	105mg
Zinc (chélate) :	25mg
Manganèse (sulfate) :	50mg
Manganèse (chélate) :	6.25mg
Cuivre (sulfate) :	27mg
Cuivre (chélate) :	20mg
Fer (sulfate) :	53mg
Fer (sulfate) :	13mg
Iode :	0.65mg
Sélénium :	0.16mg

Acides aminés/kg brut :

Lysine :	6.67g
Méthionine :	2.31g

Additifs/kg brut :

Vitamine A :	16000UI
Vitamine D3 :	2000UI
Vitamine E :	300mg
Vitamine B1 :	10mg

Mode d'emploi :

Gestation : Au minimum 8kg de foin de pré à disposition et 1 à 3kg de Repro GR*.

Lactation : Au minimum 8kg de foin de pré à disposition et 3 à 6kg de Repro GR*.

*Les rations proposées sont calculées pour couvrir les besoins nutritionnels d'une jument de 500kg. En parallèle, il est recommandé de laisser l'accès à une pierre à sel et de l'eau à volonté.

Une distribution fractionnée en deux ou trois repas par jour est préférable pour le cheval.